



Aviso preventivo de viaje ante casos de **Sarampión**

A las personas que viajan a Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de América y Venezuela, la Secretaría de Salud recomienda realizar las siguientes acciones:

Antes del viaje:

- **Aplicarse** la **vacuna** contra el sarampión **21 días antes** del viaje:
 - Niños de 6 a 11 meses de edad deben tener una dosis de vacuna triple viral (SRP) o doble viral (SR)
 - Los niños de 1 a 10 años de edad, en caso de no tener su esquema completo
 - Adolescentes y adultos que no cuenten con dos dosis de la vacuna

Notas:

- La vacuna contra el sarampión no se aplica a embarazadas
- Las vacunas contra el sarampión disponibles en México son: Triple viral (SRP; sarampión, rubéola y paperas) y Doble viral (SR; sarampión y rubéola)

Si durante el viaje o hasta 21 días después de su regreso presente fiebre y ronchas:

- No se auto-medique y acuda de inmediato a su médico
- Tome abundantes líquidos y vida suero oral o electrolitos orales para prevenir la deshidratación
- Evite contacto directo con otras personas, saludar de beso o mano, compartir cubiertos o vasos; para no contagiar
- Si usted presenta los síntomas durante el vuelo, avise al asistente de vuelo antes de aterrizar o al oficial de sanidad internacional a su llegada
- Informe al personal médico de su estancia en Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de América o Venezuela

Para cualquier duda comuníquese a los teléfonos 53-37-18-45 o LADA sin costo 01-800-00-44-800.